

INSTRUCCIONES PRE-OPERATIVAS PARA
SEDACION INTRAVENOSO

NO INTENTE MANEJAR SU VEHICULO PARA LA OFICINA. ES ABSOLUTAMENTE IMPERATIVO QUE UNA PERSONA RESPONSABLE ACOMPANE EL DIA DE CIRUGIA, PERMANESCA EN LA SALA DE ESPERA, Y MANEJE A CASA. SEA INFORMADO QUE SI SU ACOMPAÑANTE SE VA DE LA OFICINA, POR CUALQUIER RAZON, NO PODREMOS CONTINUAR CON CIRUGIA.

- Asegurese que tenga un acompañante la tarde y noche del día de su cirugía.
- ***Evite comida y líquidos después de media noche***, la noche antes de su cirugía. Si está tomando medicamento, procure tomar con un poco de agua.
- Si el paciente es menor de edad, por lo menos un padre o un padre guardian deberá acompañarlo.
- Procure dormir bastante la noche antes de su cirugía.
- Asegurese que traiga el correcto método de pago y la información de aseguransa.
- **ASEGURESE LLEGAR 15 MINUTOS TEMPRANO A SU CIRUGIA.**
- El día de cirugía, limite su dieta a sopas caldosas, pure de papa, nieve, blanquillos revueltos, pasta, etc.
- Vístase en ropa cómoda y evite blusas con cuello alto.
- Asegurese ir al baño antes de cirugía.
- Los efectos profundos que causa la sedación van a cesar ante del alivio de la oficina.
- Planear estar en casa todo el día.
- *Evite manejar su vehículo el día de cirugía y mientras este tomando el medicamento para dolor*
- Cierta nivel de actividad de sangreo, dolor, hinchazón es normal. Reduzca actividad por lo menos un día completo para promover sanamiento.
- Es normal después de sedación sentirse medio dormido.
- Extracciones de muelas de juicio y extracciones quirúrgicas son diferente a las simples extracciones. Se requiere más cuidado y reposo.

LAS SIGUIENTES CONDICIONES PUEDEN OCURIR—TODO LO CUAL ES NORMAL

- Incomodidad, tensión muscular al abrir la boca y incomodidad para tragar.
- Al Segundo o tercer día después del procedimiento, la hinchazón es más notable. Esto es normal.
- Después de 24 horas las áreas quirúrgicas se pueden enjuagar con agua tibia con sal. El sanamiento es gradual de semanas hasta meses. Los tejidos se rellenan con nuevo tejido gradualmente.
- Hay una posibilidad que los dientes adyacentes pueden estar adoloridos. Esta condición es temporal. Esto es normal.
- Pérdida de sentido en la lengua y labios por las áreas afectadas es posible por un tiempo temporario
- Otros síntomas incluye dolor de oído, dolor de garganta. Temperatura puede subir entre 24-48 horas. Si la alta temperatura continua, notifique nuestra oficina inmediatamente.
- Si se resfría, sufre problemas estomacales, diarrea, fiebres en la boca, o algo fuera de lo normal antes de cirugía, contacte nuestra oficina inmediatamente.

Nombre del Paciente: _____

Fecha de Nacimiento: _____

Firma: _____ Relación: _____ Fecha: _____